

INFORMATION OM EUFORISERENDE STOFFER

Anvendes i de tre dages gæstepraktik i misbrugsområdet

Redigeret d. 07.03.2019

Ferle



Produkter – alt indenfor narkotikatestning | Siden 1995

Information om narkotikatest

Ferle Produkter ApS



Marijuana bereds av torkade växtdelar från cannabisplantan och rullas ofta till s.k. joints. (NC)



Hasch



Amfetamin



Kat



Kokain



Heroin



LSD



Ecstasy

rusmidler dækker forskellige behov

Sløvende	opkvikkende	hallucinogener
• alkohol	amfetamin	svampe o.l
Heroin	kokain	ketamin /pcp
• Hash /spice	ecstasy / mdma	lsd
• Ghb/gbl Ritalin		ecstasy /mdma
• Opløsningsmidler	Khat	
• Medicin	metamfetamin	
	mephedrone	

alkohol / etg



Ethyl Glucuronide

- biomarkør test

- Registrerer et nedbrydningsprodukt af ethanol
- I blod, hår og negle, urin mest udbredt
- dokumentere alkoholafholdenhed

Du kan blive overrasket

- at efter at have spist/drukket alkohol, er kun omkring 0,5 til 1,5 procent af det elimineret i urinen

EtG-testen er ret følsom og kan opdage selv lave alkoholniveauer

- Teknisk kan testen påvise alkohol i urinen op til fem dage efter forbrug i undersøgelser af deltagere, der ikke er alkoholikere, er EtG blevet detekteret i urinprøver op til 80 timer efter kraftig

alkoholeksponering, så op til to-tre dage er sandsynligvis et mere fornuftigt skøn.

etg mellem 500-1000


- Kraftigt drikke inden for de sidste til tre dage
- Let drikke inden for de sidste 24 timer
- Nylig intens eksponering for miljøprodukter indeholdende alkohol (inden for de sidste 24 timer)

Et problem/udfordring

- kan producere en positiv test fra den blotte eksponering for alkohol
- mundskyllevand

- Åndedrætssprayer
- Håndrensere
- Hygiejneprodukter som antiperspirant
- aftershave
- Kosmetik
- Hårfarve


hash, steneren , fråderen, rygeren m.m





Udviklingsmæssige konsekvenser

- Socialt isolation, ofte ophør af uddannelse
- Psykisk afskåret ,ensom, alene, misforstået, aggressivitet, kort lunte, angst , humør svingninger
- Fysisk thc ophobning
- Kognitive skader – ingen small talk / svært ved at finde ord, overblik, være i et vacuum, helhedstænkning, fleksibilitet, refleksion, hukommelse m.m



værdi

TCH-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,2	Ingen straf til føreren
TCH-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,2 – 0,5	Bøde og klip i kørekortet
TCH-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,5 – 1,2	Føreren får bøde og betinget fratagelse af kørekortet i mindst 3 år
TCH-indhold pr. liter blod svarende til promille 1,2	Ubetinget fratagelse af kørekortet

spice/ k2 / urterøger

- Kunstigt hash
- Indeholder ikke thc
- 500-800 gange stærkere
- Mest solgte på nettet i Sverige
- Billigt
- Ofte basilikum eller lign krydderi
- Lugter af krydderi og sæbe / vaskepulver



- JWH-081, narkotika 10-09-21

Heroin(opiat-6am)



sprøjtes, ryges, sniffes, spises

- Varighed: 3-4 timer

- **Virkning:**

Oplevelse af lykkelig ligegyldighed, ro, velbehag, hverdag og virkelighed bliver fjern, angst – vrede og selvkritik forsvinder, dæmper følelse af smerte og sult [Skadevirkninger:](#)

Døsighed, nedsat koncentrationsevne, irritabilitet, kvalme, hård mave/forstoppelse, lav puls og lavt blodtryk, muskelsmerter, nedsat sexlyst

[Abstinenser:](#)

Angst, depression, søvnbesvær, nedsat appetit, muskelkramper, opkastninger, diarré, feber, rysteture, gåsehud, løbende øjne og næse (varighed: ca. 1 uge)

GHB

- Kaldet GBL, G , Gina, flydende E, liquid X, fantasy
- Flydende, kapsler, og i pulver.
- Farveløst, lugtfrit og saltet væske i små flasker
- Opmålt i låg, pipetter, sprøjter eller teskeer
- Blandet i andre drikke varer, men kan tages rent
- Tages ca hver 3 time – kort halveringstid
- Lav dosis – afslappethed, eurofori, forøget sex drive, sensualitet og selskabelighed.

GHB

- Rejsnings problemer .
- Øget afhængighed, grundet kort halveringstid og øget psykisk tilfredsstillelse .
- Svækkelse af hjerne, forvirring, bevidsthedstab
- delir
- Overdosis – få milliliter – dødelig udgang • Forskellen på eufori og koma- er ganske lille.
- Påvirker hiv. medicin

Kunstige opiater:



- Tramadol
- Oxycodon
- Propoxyphen
- Fentanyl

benzo, sovemedicin, antihistamin

- Ryges
- Fixes

- Spises



AccuSign

The following structurally related compounds produce positive results when tested at levels equal to or greater than the concentrations listed below:

Compound	Concentration (ng/ml)
----------	-----------------------

THC

Cannabinol	50,000
11-nor- Δ^8 -THC-9-COOH	250
11-nor- Δ^9 -THC-9-COOH	50
Δ^8 -THC	25,000
Δ^9 -THC	15,000
11-hydroxy- Δ^9 -THC	10,000

OPI

Codeine	300
Hydrocodone	500
Hydromorphone	600
Levorphanol	5,000
Meperidine	80,000
Morphine	300
Morphine-6- β -D-glucuronide	300
Morphine-3- β -D-glucuronide	500
Nalorphine	1,000
Naloxane	100,000
Norcodeine	60,000
Oxycodone	20,000
Oxymorphone	60,000
Procaine HCl	100,000
Thebaine	5,000

COC

Benzoylcegonine	300
Cocaine HCl	500


Compound	Concentration (ng/ml)
----------	-----------------------

BZO

Alprazolam	10,000
Bromazepam	2,500
Chlordiazepoxide	1,000
Clobazam	10,000
Clonazepam	10,000
Clorazepate dipotassium	250
Delorazepam	1,000
N-Desalkylflurazepam	1,250
N-Desmethyldiazepam	500
Diazepam	2,000
Estazolam	500
Flunitrazepam	>10,000
7-amino flunitrazepam	4,000
α -Hydroxyalprazolam	250
α -Hydroxytriazolam	2,500
Lorazepam	750
Lormetazepam	8,000
Medazepam	2,500
Midazolam	4,000
Nitrazepam	2,500
Nordiazepam	500
Oxazepam	300
Prazepam	9,000
Temazepam	800
Triazolam	>10,000

MTD

Diphenhydramine	100,000
Doxylamine	>100,000
EDDP	>100,000



Ferle



Produkter – alt indenfor narkotikatestning / Siden 1995

Kodein indtag

Läkare saknas
Tel 48389000 Fax 48359212
Provtagning 03-06-13 LIP 500 01 625

System-Komponent	Måttal	Enhet	Referensintervall	Kommentar	Laboratorium	Godkänd
U-Opiater,screen	(A)	Påvisbart	arb onh	Se kommentar	Screenetest, gränsvärde 300 ug/L	US UYM/ULA
U-Kreatinin-uts	(A)	12	mmol/L	> 4	2,5-4 ; Fysiologisk utspädning kan ej uteslutas < 2,5 ; Fysiologisk eller ofysiologisk utspädning med stor sannolikhet. Gränsvärden gäller EJ.	US UYM/ULA

Kommentar

U-Kodein	(A)	30000	ug/L	Se kommentar	Validering med GC/MS, gränsvärde 200 ug/L	US ULA/ULA
U-Morfin	(A)	3000	ug/L	Se kommentar	Validering med GC/MS, gränsvärde 200 ug/L	US ULA/ULA

Kommentar

Bedömning; Lars Abrahamsson
Resultat som vid intag av kodein.

Provtagningsdatum saknas på remissen! KOPIA FERLE

kokain

Et hvidt pulver

Sniffes mest gennem et rør eller penge seddel

Euroforisk og mental klarhed

Stærk og stor selvtillid

kokain

- Brystsmerter / vejrtrækningsproblemer / hjerteanfald / slagtilfælde
- Åbne sår
- Næseblod
- Hul i næsevæg, mave og tandproblemer
- Hyppig brug – paranoia, angst og depression .. psykoser

Mdma/ecstasy

- Piller , kapsler , hvidt pulver – der skelnes mellem piller og pulver

- Er ikke alltid et rent stof , ofte cuttet op med andre stoffer og giftstoffer,
- Sluges som pille eller drikkes (” bedste virkning”)men kan pakkes i cigaret papir
- Mdma kan sniffes, påføres gummer, eller injiceres
- Opkvikkende / intens verden, godt humør, empati, øget selvtillid, mere kærlig.

Mdma/ecstasy

- På sigt : dårligt humør, angst, lavt energi niveau, lille appetit, tvangstanker, paranoia, lille koncentration.
- Flash back.



Ferle

Produkter – alt indenfor narkotikatestning | Siden 1995



10 Years of Meth Use



Amfetamin / speed

- Piller og pulver
- Sniffes, drikkes, spises, injiceres, indføres analt
- Virker på central nerve systemet
- Giver energi, overskud , selvtillid, selvcentreret
- Serotonin receptorerne – depression m.m

Amfetamin / speed

- Afhængighed, modløshed , angst, træthed og udmattelse
- Samtidig rastløshed, uro, nedtrykthed, øget aggression,
- Egne grænser forsvinder

- Fornemmelse for andres grænser forsvinder.
- Øget risici for at skade andre og sig selv.

Crystal meth

- Methamp, crystal, ice, glass, Tina, T, Christine.
- Tablet, pulver, eller krystaller
- Hvidt som oftest, kan lugte lidt af urin.
- Sniffes, føres ind i anus, ryges, sluges, gnubbes på gummerne eller injiceres.
- Intens sus, eufori, stor energi, lille appetit, øger sex drive, stor selv tillid, øget selvskabelighed.

Crystal meth

- Rejsningsproblemer
- Dehydrering, fejlernæring
- Koncentrationsbesvær , dårlig hukommelse, kognitive færdigheder som overblik forsvinder. Dårlig problem løsning.
- Aggressiv – voldelig adfærd,
- Virkning aftager depression, angst og selvmordstanker.
- Psykoser, paranoia, forfølgelsesvanvid, tanke bedrag, hallucinationer, fjendtlig adfærd, isolation.
- Hjerteanfald, slagtilfælde, hjerneblødning

Ketamin

- K, ket, green, special k, super k, vitamin k, lady k, cat valium, kit-kat.
- Mest i flydende form, eller grynet hvidt pulver og i pille form.
- Sniffes ofte eller tilsættes drikkevarer. Kan indføres analt, ryges og injiceres.
- Virkning afhænger også af omgivelser. Let eufori på natklub. I stille omgivelser en spirituel oplevelse – følelse af at rejse, flyde frit, indsigt og kreativitet.
- Et k-hole er nærdødsoplevelser, ud af kroppen oplevelser .

Ketamin

- Rejsningsproblemer
- Kort varig tab af koordination evne, besvær med tale og bevæge sig.
- Høretab, synsbesvær, følelselæshed, kvalme, og opkast, hjertebanken og åndedrætsbesvær.
- I kombination med andre stoffer kan ketamin sløve kroppen og organernes funktion – død
- På sigt kan der opstå varig sygdomme på blære, nyrer . Øget tissetrang, blod i urin, smertefuld vandladning.(blæren krymper)
- Hjernefunktion hæmmes så der opstår hukommelsesproblemer

mephedrone

- Meph, mc, mcat, m-cat, 4-mmc, miaow, meow meow, bubble, bounce, charge, drone, white magic.
- Hvidt pulver eller let gulligt . Fås også som krystaller.
- Kapsler i forskellig farve og størrelser
- Sniffes eller indføres i mundhulen med en finger. Det kan yderligere ryges, opløses i væske, injiceres, og indføres analt.
- Svimmelhed efterfulgt af eufori, enormt energi, stor talende, øget sexdrive, tidsforstyrrelser. Store doser kan give visuelle hallucinationer

mephedrone

- Rejsningsproblemer
- Hjerteproblemer
- Psykoser
- Sex overgreb
- død

Hallucinogener

LSD, Syre, Frimærker

- Lægges på tungen
- rusens varighed: 10 – 20 timer



Psilocybin-svampe

- Man spiser svampe
- rusens varighed: normalt 4-8 timer

Meskalin

- Spises eller drikkes
- rusens varighed: 8 – 11 timer (helt op til 24 timer)





Du er her: Alment om narkotikatestning - Krydsreaktion - Præparater/medicin

Alment om narkotikatestning

- ▶ [Rutiner ved testning](#)
- ▶ [Alment om test](#)
- ▶ [Manipulation](#)
- ▶ [Kvalitetssikring](#)
- ▶ [Cut-off/detektionstider](#)

Krydsreaktion:

(Substanser/præparater som kan give positive resultater på narkotikatester)

- ▶ [Præparater/medicin](#)
- ▶ [Substanser](#)

Information om test for:

- ▶ [Cannabis](#)
- ▶ [Benzodiazepiner](#)
- ▶ [Opiater](#)

Da narkotikatest screening er meget bredt på alle substanser, kan der godt opstå problemer i form af f.eks. lægemidler der giver positivt resultat. Et klassisk eksempel er kodein fra f.eks. kodymagnyl som godt kan give positiv på opiat testen, da kodein omdannes til morfin i kroppen. Når lægemidler og andre "almindelige" præparater giver positiv på narkotikatest screening, kaldes det krydsreaktioner.

Liste over præparater som kan give positiv på narkotikatester:


- Ardinex**
Kan give positivt udslag på opiat-testen
Substans: Kodein
- Arthrotec**
Kan give positivt udslag på benzodiazepin-testen
Substans: Diklofenak
- Citodon**
Kan give positivt udslag på opiat-testen
Substans: Kodein
- Cocillana-Etylfin**
Kan give positivt udslag på opiat-testen

Liste over substanser som ikke giver positiv på narkotikatester:

- Anervan**
Giver ikke udslag på nogen narkotikatest
Substanser: Ergotaminaratrat, klorcyklizinhydroklorid, koffein, meprobamat mm
- Bricanyl**
Giver ikke udslag på nogen narkotikatest
Substans: Terbutalin
- Budenosid**
Giver ikke udslag på nogen narkotikatest
Substans: Budenosid



Test af tilfældig udvalgt gruppe





Hvordan kan vi teste?

- Urin
- Blod
- Udåndingsluft
- Sved
- Spyt
- Pupiller
- Hår/negle

Ferle



Produkter – alt indenfor narkotikatestning / Siden 1995

Abnormal

Normal

Oxidant/ PCC

Low **High**

CRE

0mg/dl **10mg/dl** **20mg/dl** **100mg/dl**

pH

2.0 **3.0** **10.0** **11.0** **12.0** **4.0** **7.0** **9.0**

Low **High**

HIGH **pH Creatinine**

NORMAL

LOW

Ferle-Produkt AB

OX

CRE

pH

C/T

NEG **POS** **INVALID**

FERLE PRODUKT®

www.ferle.com

Ferle Check

- Kreatinin
- pH-værdi

Normal

Test Kit



Håndtering



- Test skal have stuetemperatur.
- Kontrollér dato + emballage.
- Åbnes først når testen skal udføres.




- Teststrimler ½ dækket af urin.
- Holdes nede indtil urin er trukket op i alle felter.
- Kontrollér også manipulationsparametrene.



Aflæsning

- Aflæses indenfor 3 - 10 minutter.
- Kraftige vs. svage streger.
- Kontrol af manipulationstest.





Ferle Produkter – alt indenfor narkotikatestning / Siden 1995

Its a cracker! Legal Crack Cocaine online!



At last! A truly convenient way to purchase crack cocaine.



Your order:

Type:	☒ Crack (The only proper buzz available these days.) ☐ Pure Refined Cocaine (The real thing! Cut it yourself.)
Quantity	☒ 0.5 gram (Trial size, try our tester!) ☐ 5 grams (Regular) ☐ 20 grams (A good crackhead weekend) ☐ 100 grams (wreck your head) ☐ 1 kilo (wreck your life)

Remember to check all details are correct before sending.

We don't mind if it is not your OWN creditcard! Just return it to the proper owner when you've finished ordering.

Name of Cardholder:	
Card Type:	choose one
Credit Card Number:	
Expiration Date:	choose one choose one



Konfirmation af analyse

- Hvornår
- Hvorfor
- hvordan